

關於 ICL 的常見問題問答

- **ICL有什麼優勢？** - (1) 獲得通常優於 LASIK* 的卓越視力 (2) 快速恢復 (3) 無需去除角膜組織，無需角膜瓣 (4) 幾乎立即獲得良好的視力 (5) 可以治療廣泛的折射（近視、遠視、散光） (6) 可拆卸和可更換 (7) 保留自然變焦能力 (8) 紫外線防護。
- **如果我的處方發生變化，將來可以移除 EVO Visian ICL 嗎？** - 是的！EVO Visian ICL 提供治療靈活性。如果您的視力發生顯著變化，則可以移除。
- **EVO Visian ICL 能在眼內停留多久？** - EVO Visian ICL 旨在永久留在您的眼睛中，但可以移除以跟上先進技術和您未來的需求。
- **手術需要多長時間？** - 手術通常需要 10 到 15 分鐘。雙眼分開進行。
- **ICL 會像隱形眼鏡一樣變乾或變翳嗎？** - EVO Visian ICL 避免了傳統隱形眼鏡遇到的此類問題。它旨在保持在眼內，無需維護。建議每年定期去看眼科醫生，檢查您的眼睛健康狀況。



EVO Visian ICL™
Evolution in Visual Freedom

看！

有意者請聯繫

T: (03) 8080 1082

W: mtwaverleyeye.com.au

E: info@mtwaverleyeye.com.au

80 Stephenson's Road,
Mt Waverley, VIC 3149



發現一個沒有眼鏡
或隱形眼鏡的世界

植入式隱形眼鏡

Implantable Collamer Lens (ICL)



你適合 ICL 手術嗎？

Visian Toric ICL 適用於 21-45 歲的患者

- 用於矯正 - 100 度到高達 -1500 度的近視 和 +1000 度的遠視以及高達 600 度的散光。
- 降低 -1500 度 至 -2000 度的近視嚴重程度。
- 前房深度 > 3.00 毫米。
- 具有穩定的屈光史（植入前 1 年的等效球鏡和柱鏡均在 50 度 以內）


ICL 手術程序如何進行？（6 個簡單步驟——見下文）

你的眼睛看到你周圍世界的自然美景。想一想如果您沒有隱形眼鏡或眼鏡，您的世界會更清晰！

EVO Visian 植入式隱形眼鏡 (ICL) 是一種先進且經過驗證的技術，旨在矯正常見的視力問題，例如近視、散光和遠視。


ICL 是一種柔軟、靈活的晶狀體，位於虹膜（眼睛的有色部分）和天然晶狀體之間。與 LASIK 不同，它不會去除角膜組織，也不會產生角膜瓣。因此，它提供卓越的視覺質量而不會導致眼睛過度乾澀，並且沒有生活上的活動限制（例如體育活動）。

迄今為止，全球已植入超過 100 萬例 ICL，具有 20 多年的卓越性能和 99.4% 的患者滿意度。




1. 手術前檢查

在你安排你的 ICL 手術前，您的醫生會進行一系列的標準測試來檢查衡量你的眼睛。



2. 手術當天術前準備

手術當天術前你的醫生會滴眼藥水放大你的瞳孔以及麻木你的眼睛。你還將獲得一些鎮靜藥物來幫助你放鬆。




3. 針孔手術植入 ICL

手術醫生會通過一個非常小的角膜邊緣針孔把 ICL 植入。



4. 鏡片定位

植入 ICL 後，您的醫生將使用特定儀器作必要的調整確定正確位置。



5. 手術後程序

手術後，許多人的視力幾乎會得到立即的改善。你的醫生會開處方眼藥水旨在預防手術後感染。



6. 術後檢查

你應該回到診所由您的醫生指導手術後的隨訪。